




การป้องกันช่วยเหลือในชุมชน: การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากยุง

เส้นทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้





ทำความสะอาดบ้าน ปิดฝาถังเก็บน้ำ ใส่เสื้อผ้ามิดชิด และทำอย่างต่อเนื่อง!

รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างล่างคือสิ่งที่ควรทำความสะอาดเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อที่เกิดจากยุง กรูนาศึกษาให้ละเอียด ข้อแนะนำเหล่านี้มีประโยชน์ต่อคุณและครอบครัว

- โรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก, โรคไข้ซิกก้า, โรคไข้ป่าดงข่อยลาย และโรคอื่นๆ สามารถเป็นได้หากโดนยุงกัด
- ทุกคนมีโอกาสติดโรคได้ เด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้หญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงสูง ไวรัสซึ่งกันนี้มีผลกระทบรายแรงต่อเด็กการในครรภ์
- อาการโดยทั่วไปของโรคติดต่อจากยุงลายคือ:
 - มีไข้และปวดหัว
 - ผื่นแดงตามตัวและตาแดง
 - ปวดตามข้อ กล้ามเนื้อ และบริเวณหลังตา
 - คลื่นไส้อเจียน
- หากมีอาการป่วย การได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ ในช่วงแรกที่ป่วย จะสามารถป้องกันการป่วยเรื้อรัง หรือการตายได้ ถ้ารู้สึกว่าป่วยควรรีบไปรับการรักษาจากแพทย์และผู้ให้บริการทางการแพทย์ทันที จำไว้ว่าต้องกินยาตลอดตามคำสั่งของแพทย์ ห้ามหยุดยาเองถึงแม้ว่าจะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตาม
- พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ยุงกัด เพราะถ้าป่วยเป็นโรค เราสามารถแพร่เชื้อโรคให้คนอื่นต่อได้ หากเราถูกยุงที่มีเชื้อโรคกัด
- ใช้มุงป้องกันยุง การมุงตอนนอน สามารถป้องกันยุง และลดโอกาสของการติดเชื้อโรค จากยุงที่มีเชื้อโรคได้
- สามารถหลีกเลี่ยงป้องกันการถูกยุงกัดโดย:
 - ติดมุงลวดตรงหน้าต่างและประตูทุกบาน
 - สวมใส่เสื้อแขนยาวและการเก็บชายหาด
 - จุดยา กันยุงที่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แนะนำ
 - สวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อน – ยุงชอบเสื้อสีเข้มที่มันสามารถหลบซ่อนได้
- แนวใจว่ายุงไม่สามารถวางไข่ได้ โดยการทำให้พื้นที่รอบบ้านสะอาดและไม่มีน้ำขังหรือน้ำนิ่งอยู่ใกล้ หรือภายในบ้านและพื้นที่ชุมชน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยุงและโรคติดต่อจากยุง กรูนาศึกษาเพิ่มเติมในเว็บไซต์ www.ifrc.org/dengue

สภากาชาดไทย

1871 อาคารเทิดพระเกียรติ

ถนนวงศ์ดุนังช์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2256-4038

โทรสาร 0-2255-3064

อีเมล intertrc@redcross.or.th

เว็บไซต์ www.redcross.or.th

