

เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในเรื่องต่างๆ

๑. การให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร ผู้ประสบภัยควรได้รับอาหารที่มีจำนวนแคลอรีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเท่าไร/คน/วัน
๒. การให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนเพื่อให้มีความทัดเทียมในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด มีเกณฑ์ในการจัดสถานพยาบาลต่อผู้ประสบภัยอย่างไร
๓. แหล่งน้ำชนิดใดที่ควรเลือกใช้ผลิตน้ำสำหรับแจกจ่ายผู้ประสบภัย
๔. ในการควบคุมโรคติดต่อและการระบาดรวมทั้งการตอบสนองต่อการระบาดนั้น มีดัชนีชี้วัดหลักเกี่ยวกับอัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อทั้งหมด (case fatality rates หรือ CFRs ไม่เกินเท่าไร
๕. จงบอกชื่อโรคที่สัมพันธ์กับน้ำและสิ่งขับถ่ายมา อย่างน้อย ๕ ชนิด
๖. ผู้ประสบภัยควรได้รับน้ำสะอาดสำหรับดื่ม ปริมาณ เท่าไร/คน/วัน
๗. จงบอกช่วงอายุสำหรับการฉีดวัคซีนโรคหัด และในกรณีที่มีทรัพยากรจำกัดควรให้ความสำคัญกับกลุ่มใดเป็นลำดับแรก
๘. เมื่อตรวจคุณภาพน้ำ ควรมี faecal coliforms / ๑๐๐ ml เท่าไร
๙. ตัวชี้วัดที่นิยมใช้ในการวัดระดับภาวะทุพโภชนาการในเด็กอายุ ๖-๕๙ เดือน และเกณฑ์ที่ใช้เป็นอย่างไร
๑๐. ปริมาณน้ำที่ต่ำที่สุดสำหรับ ศูนย์รักษาผู้ป่วยท้องร่วงร้ายแรง
๑๑. จำนวนประชากรผู้ประสบภัย ต่อจำนวนสุขา ๑ ห้อง
๑๒. การออกแบบ การสร้าง และสถานที่ตั้งห้องสุขา ควรมีลักษณะอย่างไร
๑๓. แต่ละครัวเรือนควรมีภาชนะกักเก็บน้ำ ขนาดเท่าใด และจำนวนเท่าใด

๑๔. ขนาดพื้นที่ที่ใช้คำนวณในการจัดตั้งศูนย์พักพิง ควรมีพื้นที่มิดชิด ส่วนบุคคลเท่าไร ต่อ/คน และศูนย์พักพิงควรมีพื้นที่รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ต้องการพื้นที่กี่ ตารางเมตรต่อคน

๑๕. การยืนยันโรคระบาด หากพบผู้ป่วยโรคใด แม้เพียงรายเดียวก็ถือว่าเกิดการระบาด ให้บอกมา อย่างน้อย ๓ โรค

๑๖. อัตราตายอย่างหยาบที่เพิ่มเป็นกี่เท่าที่จะชี้ให้เห็นถึงภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และต้องมีการตอบสนองทันที และหากไม่ทราบอัตราตายอย่างหยาบก่อนเกิดเหตุจะทำอย่างไร

๑๗. ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ควรได้รับเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ที่เพียงพอ เป็นจำนวนเท่าไร

๑๘. ระยะทางระหว่างที่พักอาศัยแต่ละหลังไปยังจุดจ่ายน้ำที่ใกล้ที่สุด ไม่ควรเกินเท่าไร

๑๙. ในสถานบริการสุขภาพ ควรมีแพทย์จำนวนเท่าไร ต่อผู้ป่วย ๑๐๐ คน/วัน

๒๐. ตามมาตรฐานการเข้าถึงและปริมาณน้ำ ในการร่อน้ำของ ผู้ประสบภัยในแต่ละครั้ง ไม่ควรนานเกินระยะเวลาเท่าไร